

服藥須知（精神安定劑）


服藥目的：

改善焦慮，情緒波動，攻擊行為，過度活動性，緊張敵視，不合現實的幻覺妄想，欠組織的思考，失眠，退縮等症狀。以使病人能適應家庭社會生活，恢復互作能力。






常見的精神安定劑 (1)






常見的精神安定劑 (2)






常見的精神安定劑 (3)



常見的精神安定劑 (4)







常見的精神安定劑 (5)



服藥須知（精神安定劑）

**在醫師的診斷和指導下，服用本類藥物是安全的！
您必須規律地服藥，且經醫師診斷同意後才減量或
停藥！！**

服藥須知（精神安定劑）

-  藥物副作用：和其它藥物一樣，本類藥物也會產生一些藥物副作用。
-  若有下述症狀請和您的醫師討論，以獲得調整藥物，加開解副作用藥物，或自我照護的方法。
-  您也可利用藥劑科窗口諮詢及電話諮詢專線(04-23710100轉1110)，由我們為您解說服務。
-  切記：若您因副作用的困擾，而自行停藥，也許會錯失了治療良機










服藥須知（精神安定劑）



可能之副作用：

過度鎮靜、昏昏欲睡、
舌喉頸背部肌肉痙攣僵硬、眼球上吊、
靜坐不能、坐立不安、
流口水、四肢擺動不自然或顫抖、
面部肌肉僵硬、面具臉、
小碎步走路、動作遲緩、
暫時性低血壓、眩暈、
口乾舌燥、視力模糊、便秘、排尿困難
性慾減退、月經不順、體重增加或減輕、

服藥須知（精神安定劑）

-  一般注意事項：若有疑問請與醫師或藥師連絡
-  服藥初期可能引起暈眩或嗜睡，宜避免開車或操作危險機械。
-  請避免大量飲酒或未經醫師處方服用中樞抑制劑，以免造成藥物加成作用
-  若併用其它科藥物或成藥，請和醫師討論是否可合併服用。
-  某些藥物須定期抽血檢驗，您可主動詢問醫師，以獲得好的醫療照護。
-  若疑是過敏反應：發燒、喉嚨痛、疲倦、嘔吐、腹瀉、皮膚疹等，請速就診。
-  滴劑宜避免直接接觸皮膚，以避免皮膚發炎。需避光儲存。
-  滴劑可混合果汁、食物等服用，但稀釋後儘快服用，且避免再加熱後才服用。
-  準備懷孕或已懷孕，請和醫師討論用藥。